

## ¿QUÉ ES LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Ledispavir+Sofosbuvir (Harvoni®) es un medicamento antiviral utilizado en adultos para tratar la hepatitis C crónica (de larga duración).

## ¿CÓMO DEBE TOMARSE EL MEDICAMENTO?

Los comprimidos se administran por vía oral y no se deben masticar, machacar o disolver.

Se toma 1 comprimido una vez al día, acompañado o no de alimentos .

Lávese las manos antes y después de tomarse el medicamento.

Este medicamento contiene LACTOSA.

## ¿QUÉ DEBERÍA HACER SI OLVIDO TOMAR UNA DOSIS?

- Si se da cuenta en el plazo de 18 horas desde el momento en que toma el medicamento habitualmente, debe tomar el comprimido lo antes posible. A continuación, tome la siguiente dosis a la hora habitual.

- Si han pasado 18 horas o más espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual.

- Recuerde que NUNCA debe tomar dos dosis juntas.

- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico.

## ¿CÓMO DEBE CONSERVARSE EL MEDICAMENTO?

- Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación

## MEDICAMENTOS Y COMIDAS A EVITAR

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluidos los que no necesiten receta (así como productos de herboristerías o plantas medicinales) y especialmente si toma:

- Rosuvastatina, pravastatina
- Rifampicina, rifapentina, rifabutina
- Carbamazepina, fenitoina, fenobarbital, oxcarbazepina
- Simeprevir
- Tipranavir
- Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)
- Digoxina

- Dabigatrán

- Medicamentos utilizados para tratar las úlceras de estómago, los ardores o el reflujo ácido (p. ej. omeprazol, ranitidina...)

## ANTIRRETROVIRALES NO PERMITIDOS

En caso de que usted este en tratamiento para la infección por VIH, recuerde que algunos medicamentos antirretrovirales NO deben ser administrados junto con Ledispavir+Sofosbuvir, tal como tipranavir.

Si también recibe eivitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir o tenofovir y un inhibidor de la proteasa (p. ej. atazanavir o darunavir) se debe vigilar las reacciones adversas relacionadas con tenofovir.

## POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Este medicamento tiene efectos adversos frecuentes, pero no significa que aparezcan en todos los pacientes.

Los más frecuentes son:

- astenia (cansancio)
- dolor de cabeza

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## EMBARAZO Y LACTANCIA

Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

No se recomienda el uso de este medicamento durante la lactancia.

## RECUERDE QUE

Si vomita después de tomar Ledispavir+Sofosbuvir esto puede afectar a la cantidad en la sangre.

- Si vomita en menos de 5 horas después de tomar el medicamento, tome otro comprimido.
- Si vomita tras más de 5 horas no es necesario que tome otro comprimido hasta el próximo que tiene programado.


Debe devolver los comprimidos que no use al farmacéutico.

#### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### SU FARMACEUTICO LE ACONSEJA:

- Antes de iniciar cualquier tratamiento debe leer el prospecto de los medicamentos. La información contenida en este folleto, es complementaria. Solicite al médico o farmacéutico toda la información que precise.
- Sólo debe tomar el medicamento si se lo ha prescrito su médico. Su tratamiento es para uso personal. No comparta la medicación con otros pacientes.
- Revise la fecha de caducidad. No tome medicamentos caducados y devuelva a la farmacia cualquier medicamento sobrante o caducado.
- No cambie los medicamentos de envase. Consérvelos siguiendo las instrucciones que se indican. Como norma general: proteger de la luz, del calor, de la humedad y fuera del alcance de los niños. Guarde en frigorífico sólo aquellos medicamentos que lo necesiten.
- Es muy importante tomar la medicación, a la hora que se le indique, y no olvidar ninguna toma.
- Los medicamentos a veces pueden producir efectos no deseados. Informe a su médico sobre cualquier cambio observado durante su tratamiento.
- Si visita a otro médico infórmele siempre de toda la medicación que está tomando.
- Presente siempre la receta, para la dispensación de medicamentos.
- Devuelva a la unidad de farmacia la medicación que no esté tomando en su tratamiento actual.

Unidad de Gestión Clínica de Farmacia  
Consulta de Atención Farmacéutica de patologías víricas.  
[www.farmaciovaimecpv.com](http://www.farmaciovaimecpv.com)  
[consultas@farmaciavaimecpv.com](mailto:consultas@farmaciavaimecpv.com)  
teléfono: 955015467  
Área Hospitalaria de Valme



Consulta de Atención Farmacéutica  
Patologías Víricas

## INFORMACIÓN AL PACIENTE

**LEDIPASVIR 90 mg + SOFOSBUVIR 400 mg  
comprimidos**

**HARVONI®**

