



¿Qué es MAVIRET®?

Es un antivirico que contiene **Glecaprevir y Pibrentasvir**, utilizado en el tratamiento del **Virus de la Hepatitis C** con el propósito de eliminar el virus.



¿Qué dosis debo tomar?

Excipientes: lactosa

Debe tomar tres comprimido una vez al día:

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar MAVIRET®?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de 18 horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad. En caso contrario, **no tome** una dosis doble para compensar el olvido.

En caso de vómito, tómela de nuevo si ha pasado menos de tres horas desde que ha tomado el medicamento.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a contiene Glecaprevir, Pibrentasvir o alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad hepática grave.
- Embarazo o lactancia



¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - o Dolor de cabeza y cansancio.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - o Náuseas y diarrea.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿MAVIRET® puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Maviret® son:

Amiodarona, IBPs (Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol), Anti-ácidos, Dabigatran, Edoxaban, Estatinas
Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenitoina, Fenobarbital, Pazopanib, Colchicina, Rifabutina, Rifampicina, Topotecan
Bosentan, Etinilestradiol
Bilastina, Everolimus, Efavirenz, Darunavir, Atazanavir, Lopinavir
Hierba de San Juan

¿Cómo debo conservar MAVIRET®?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

