

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - o Dolor de cabeza, cansancio y náuseas.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - o Insomnio y nerviosismo
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - o Arritmias cardíacas.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿EPCLUSA® puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Epclusa® son:

Amiodarona, IBPs (Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol), Anti-ácidos, Dabigatran, Edoxaban, Estatinas

Carbamazepina, Oxcarbazepina, Fenitoina, Fenobarbital, Pazopanib. Colchicina, Rifabutina, Rifampicina, Topotecan

Gazoprevir, Bilastina, Everolimus, Efavirenz,

Hierba de San Juan

¿Cómo debo conservar EPCLUSA®?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla

