



¿Qué es ENTECAVIR?

Es un antivirico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento de la **Hepatitis B** para mantener la carga viral indetectable

¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar un comprimido una vez al día:

Excipientes: lactosa

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar ENTECAVIR?

Deberá tomar la dosis indicada **sin alimentos (30 minutos antes o dos horas después de las comidas) una vez al día.**

No fraccione ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad. En caso contrario, **no tome** una dosis doble para compensar el olvido

En caso de vómito, tómela si ha pasado menos de 1 hora desde que ha tomado el medicamento.



¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Entecavir o alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad renal o hepática.
- Embarazo o lactancia

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - o Insomnio, somnolencia, cansancio, dolor de cabeza diarrea, nauseas, vómitos, y mareos.

¿ENTECAVIR puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome.

¿Cómo debo conservar ENTECAVIR?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

