



¿Qué es LAMIVUDINA?

Es un antivírico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** y la **Hepatitis B** para mantener la carga viral suprimida



¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar un comprimido una vez al día:

Horario																							
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24					

¿Cómo debería tomar LAMIVUDINA?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día.**

No fraccione ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, tómela de nuevo si ha pasado menos de 30 minutos desde que ha tomado el medicamento.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia lamivudina o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática o cardiovascular.
- Embarazo o Lactancia.



¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - o Diarrea, náuseas, cansancio, insomnio y dolor de cabeza.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - o Dolor óseo/muscular y reacciones cutáneas.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - o Angioedema y rabdomiolisis

¿ LAMIVUDINA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con lamivudina son:

¿Cómo debo conservar LAMIVUDINA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Área de Gestión Sanitaria
Sur
de
Sevilla

