



## ¿Qué es TENOFOVIR?

Es un antivirico que impide la replicación viral, utilizado en el tratamiento del **VIH** y la **Hepatitis B** para mantener la carga viral suprimida

## ¿Qué dosis debo tomar?

Excipientes: lactosa

Debe tomar un comprimido una vez al día:

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

## ¿Cómo debería tomar TENOFOVIR?

Deberá tomar la dosis indicada **con alimentos una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad. En caso contrario, **no tome** una dosis doble para compensar el olvido

**En caso de vómito**, tómela si ha pasado menos de 1 hora desde que ha tomado el medicamento.

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Tenofovir o alguno de sus excipientes
- Historial de enfermedad renal o hepática.



## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - o Diarrea, náuseas, mareos y reacciones cutáneas.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - o Cansancio, dolor abdominal y dolor de cabeza.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
  - o Hepatitis, angioedema y osteoporosis

## ¿TENOFIVIR puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Tenofovir son:

Diclofenaco y otros AINEs
Verapamilo, Furosemida

## ¿Cómo debo conservar TENOFIVIR?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

