











FÁRMACO	RECOMENDACIONES DE ADMINISTRACIÓN
INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA ANÁLOGO DE NUCLEÓSIDOS (ITIAN)	
	Tomar preferiblemente con comida ligera
	Tomar con comida
	Sin restricciones de comida
	Administrar con el estómago vacío, al menos 2 horas antes o 2 horas después de las comidas
	Sin restricciones de comida
	Sin restricciones de comida
LAMIVUDINA 300 mg	Sin restricciones de comida
ZIDOVUDINA 300 mg	Sin restricciones de comida
OTRAS COMBINACIONES	
	- Se recomienda tomar con el estómago vacío - Se recomienda tomar al acostarse


ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES CCR5

	Sin restricciones de comida
MARAVIROC 150mg	Sin restricciones de comida




INHIBIDORES DE LA PROTEASA (IP)

 	Tomar con comida
 	Tomar con comida
	Tomar con o después de las comidas
	Sin restricciones de comida
	Sin restricciones de comida

INHIBIDORES DE LA INTEGRASA

	Sin restricciones de comida
---	-----------------------------

INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO ANÁLOGO DE NUCLEÓSIDOS (ITINN)

 <p>INTELENCE 100 mg comprimidos etravirina. Via oral</p>	<p>Después de una comida</p>
 <p>SUSTIVA 600 mg comprimidos con cubierta pelicular efavirenz Via oral Bristol-Myers Squibb</p>	<p>-Se recomienda tomar con el estómago vacío -Se recomienda tomar al acostarse</p>
 <p>Viramune 200 mg comprimidos 48 comprimidos Roche/Ingram Berlingo</p>	<p>Sin restricciones de comida</p>